

洞
天
奧
旨

洞天奧旨卷之十三

山陰陳士鐸敬之甫號遠公著 曾孫陳鳳翔羽儀甫梓

會稽陶式玉尚自甫號存齋 玄孫增方朔潤民校

跌打損傷瘡 附破傷風

跌打損傷瘡皆瘀血在內而不散也血不活則瘀不能去
瘀不去則折不能續初傷之時必須內服活血止痛之藥
外用三七研末加酒調爛敷之痛即止血則散瘡上如沾
三七末乾燥再不潰矣如不沾石頻用三七末滲之多用

三七藥末調服尤妙倘不效用前藥不效者此日久瘀血留中非草木之味所能獨散也必須加入水蛭三錢當歸大黃白芍治之連用三劑瘀血無不即散而痛亦止矣三劑之外斷不可多服仍單服三七未有不愈者矣如破傷風頭痛寒熱角弓反張如瘧狀用蠶盤散最妙

散瘀至神湯 岐天師傳方治跌打損傷至重者

三七 三錢 當歸 五錢 白芍 五錢 大黃 三錢

丹皮 三錢 枳殼 一錢 桃仁 十四粒 生地 五錢

大小薊 三錢 紅花 一錢 水酒各半煎八分服如日久

疼痛或皮肉不破而疼痛加水蛭切碎如米大烈
火炒黑研碎煎前藥煎好加入水蛭末吞服三劑
則不痛矣其水蛭必須炒黑萬不可半生則反害
人矣

蠶蟄散 傳世方治破傷風瘡

川芎 一錢 當歸 一錢 紅花 四分 羌活 六分

防風 八分 白僵蠶 一錢 土鱉蟲 七個搗碎

穿山甲 三大片 柴胡 七分 生甘草 四分 水酒各半煎

八分服下部加牛膝 一錢

日曬瘡

日曬瘡乃夏天酷烈之日曝而成者也必先疼後破乃外熱所傷非內熱所損也大約皆奔走勞役之人與耕田胼胝之農夫居多若安閒之客安得生此瘡乎故止瀕消暑熱之藥如青蒿一味飲之外用末藥敷之即安

青蒿飲 祖傳治日曬瘡

青蒿 一兩 搗碎 以冷水沖之取汁飲之將渣敷瘡上數

日即愈如不愈另用栢黛散敷之

栢黛散 祖傳外治日曬瘡并治火瘡瘡

黃栢 二錢 青黛 二錢 各研末以蘇油調搽卽愈

虎噬瘡

虎噬瘡乃遇虎咬傷之瘡也虎之捕人如猫之捕鼠有毒涎惡炁噴人之面人輒驚喪一時昏憤失神卽自褫其衣以謝虎而虎不知其悔罪而吞噬矣故凡人遇虎不必自解其衣若不解衣者虎不敢食卽有所傷必可救也以人非虎食耳然而人被虎傷者血必大出其傷處之口立時潰爛其疼不可當以虎之爪牙最毒一有傷損則毒侵肌膚未有不爛者矣急用猪油貼之無猪油則用猪肉亦可

隨貼隨化隨化隨易則疼熇少緩急用榆根散滲之隨滲
隨濕隨濕隨滲血必止矣一止血而命可奪也世有一遇
虎損以香油灌一二碗以祛毒仍用香油以洗瘡亦佳然
終不若吾法之奇也倘內服安神益氣之藥外用玉真散
生肌等藥尤妙

榆根散 治虎隨載末卷

又方

地榆二兩飲并爲末敷之亦可爲末白湯調服一

兩作三次飲忌飲酒

犬咬瘡

犬咬瘡多在人身兩足併腿上也間有咬傷兩手者急用生甘草煎湯洗之則毒散而不結貴用玉真散或搽或服皆可無恙也惟瘋犬傷人其毒最甚急打散頭髮頂內細看有紅髮如銅鍼者卽拔去次以地骨皮一把約一兩煎湯洗去黃內亦服之次用地龍糞爲末將咬傷處封好口出犬毛卽無虞矣倘人已發狂如狗狀大小便俱閉外勢急痛腹脹甚者前方又不能解亟用活命仙丹解其熱毒斷不死亡也

活命仙丹 岐天師傳治瘋狗咬傷

木鱉子

三個切片 斑貓 七個去頭足

大黃

五錢

劉寄奴

五錢 茯苓 五錢 麝香 一分

各研細和勻黃酒

調服三錢一服而毒氣熱氣全解重者二服必愈

咬七日內者皆能建功過七日外必須多服數劑

無不可救

千金方 家傳治犬咬傷

紫蘇葉

三片 薄荷葉 十片

嚼傳之自愈

經驗方 治犬咬

舊屋瓦上刮下青苔屑按之卽止

鼠嚙瘡

鼠嚙瘡或因捕鼠被傷而得者也鼠膽最怯豈敢咬人因人捉拏甚急不得已咬傷人皮肉以糞脫逃是奪命心急故咬傷亦重也夫鼠技有限何足害乎不知鼠齒細長嚙肉必傷筋骨况鼠涎原有毒也筋肉既破必透入鼠涎故往往爛穿筋骨矣宜用猫尿搽其傷處其毒隨散後以末藥敷之數日卽愈也

禁鼠丹 岐天師傳治鼠傷瘡

猪糞

一錢

輕粉

一

三七根

五

各焙乾研細爲末

填滿瘡口卽結靨而愈

馬汗瘡

馬汗瘡沾馬汗而爛者也馬汗沾無瘡之人何能生瘡惟原生瘡之人最忌馬汗入于瘡內蓋馬性最動瘡沾其汗欲收口者不收欲生肌者不生矣生者不生收者不收必有變動難愈之苦或焮腫或疼痛者有之治法以冬瓜皮絲瓜葉煎湯洗之另用末藥搽擦自愈

靜寧散

岐天師傳治馬汗瘡

輕粉 三分

五倍子 一錢

炒

古石灰

絲瓜根

錢

冰片

一分

麝香

錢

搽之即愈如瘡乾痛加生甘

草五分以蜜搽之

靈苑方 治馬汗入瘡腫痛急療之遲則毒深

生烏頭為末敷瘡口良久有黃水出即愈

火癩瘡

火癩瘡乃天氣嚴寒向火烘手炙傷皮膚因而成斑變成
痛瘡者也此瘡貧窮之人居半卑弱之人居半也氣血內
虧火焰外通當時不知炎威久則天溫有汗氣血回和因

而作痛矣外用薄荷荆芥苦參各等分煎湯洗之如已破用栝蠟散搽之無不速痊

荷芥湯 外治火癩瘡

薄荷 二錢 荆芥 二錢 苦參 二錢 煎湯一碗洗之即

愈如被用栝蠟散搽之

灸火瘡

灸火瘡用艾火灸穴治病而成者也灸穴不發不可然過發亦不可過發必至疼痛宜用太乙膏貼之如無太乙膏春月用柳絮夏月用竹膜秋月用新棉冬月用壁上錢貼

之亦能止疼也如灸瘡血出不止者莫妙用黃芩爲末酒調服二錢無不止者此李按怪證奇方也然用之實驗甚

濟生秘覽方

治灸瘡不斂神效并可斂惡瘡

瓦松陰乾

爲末先以槐枝葱白湯洗後搽之立效

汗浙瘡

汗浙瘡乃肥人多汗久不洗浴淹浙肌膚因而成瘡者也亦有皮破血出而作痛者古人以真蛤粉滑石末搽之自愈實妙法也

蛤粉散

治汗浙成瘡

真蛤粉五錢 滑石末錢二 二味摻瘡上即愈

獨骨瘡

獨骨瘡生于頤頰之下大人小兒皆有之而小兒居多乃口津下流積滯之故也如是大人乃任脈虧損宜用內治如小兒外治易愈不瀆用內消之藥但少食瓜果則得矣

燥津丹 天師傳治大人獨骨瘡

扶苓 三錢 白朮 三錢 薏仁 五錢 山藥 五錢

白朮 十個 甘草 一錢 黃栢 二錢 陳皮 五分

天花粉 一錢五分 水煎服以愈為止

制津丹 世傳治小兒獨骨瘡

百合 一兩
黃蘗 一兩
白芨 三分
草薺子 五十粒

輕粉 五分
右為細末搽之如乾者以朴硝水和餅

貼之

竹木簽破傷 水生瘡

傷水瘡者因誤被竹木簽破皮膚又生水洗之潰而疼痛

或魚刺諸骨破傷久而不愈同用黃丹蛤粉文蛤等分同

炒變色摻瘡口上漸次而愈如刺已入肉搗鼠腦同鹿角

末同塗傷上即出如骨刺入肉用象牙刮末厚敷其刺自

軟卽出也

梅師方 治 竹木鍼刺在肉中不出疼痛

王不留行 爲末調熱水方寸匕以根敷卽出

蛇咬瘡

蛇咬瘡最毒不止 虺蛇也或在足上或在頭面或在身腹
之間疼痛異常重者必至足腫如斗面腫如盤腹腫如箕
五日不救毒氣內攻于心而人死矣蓋蛇乃陰毒陰毒以
陽藥解之其毒益熾必須用陰分之藥順其性而解之爲
妙外治之法最神者取半邊蓮草搽而搽之頃刻卽安隨

用祛毒散飲之三劑卽全愈外治之方如蜈蚣散亦神皆
可用也若蛇誤入人孔竅之內卽以針刺其尾則自出不
過二三針也北直田野間一婦人小遺蛇入陰戶竟不知
用針刺尾之法卒至暴亡可憫也余故特誌之以傳世云

祛毒散 岐天師方內治蛇咬蒼毒

白芷 一兩 生甘草 五錢 夏枯草 二兩 蒲公英 一兩

紫花地丁 一兩 白礬 三錢 水煎服三劑全愈

蜈蚣散 伯高太師傳外治蛇咬

白芷 一兩 取雄黃 五錢 蜈蚣 三條 樟腦 三錢 各爲極

細末以香油調搽腫處隨乾隨掃蛇毒盡出而愈

蜈蚣可瘡

蜈蚣叮人雖不成瘡然痛亦苦楚蜈蚣有二種一赤足一黃足黃足者叮人痛轉而不久赤足者叮人甚久而痛重以赤足之毒勝于黃足也倘爲所咬以蝸牛之涎搽之其痛卽止如北地無蝸牛用雞冠血塗之有雄黃末搽香油紙條點火燻其傷處立刻止痛或以山茱萸一粒口嚼敷之亦妙更有人誤食蜈蚣遊過之物腹痛者以紫金錠研碎薑湯調飲半錠嘔吐而愈

蝟牛散 治蜈蚣咬傷作疼

雄黃末

一錢

蝟牛

一條

搖爛

敷患處卽平口嚼山菜莢

一粒敷患處卽止痛取蜒蚰塗上卽止痛神驗

蝟傷瘡

蝟傷最毒以蝟得至陰之惡氣也凡一螫入痛至雞鳴乃止卽以冷水漬指并手卽不痛水微煖便痛卽易凉水再漬以青布搨之實驗蝟有雌雄者痛在一處雌者痛牽諸處以山菜莢一粒嚼以封之立愈取人參嚼敷尤妙

千金方 治蝟蠱叮螫

水調礪砂塗之立愈

蜂咬瘡

蜂之咬人有毒刺入肉內卽瀉挑去以尿泥塗之卽止痛

肘後方

青蒿嚼碎封之卽安

螞蟥傷痛

螞蟥傷人其毒在毛而不在口如楊柳瓦螞之類凡有蟲而帶毛者皆瀆忌之勿使之刺人肌膚也若一犯之則皮膚腫痛如火之燎矣以淡荳豉搗敷之蝨有毛外卽不

痛如毛未出仍痛再擦之須得毛出始安如無荳豉或醋或鹽酒芝麻油洗之皆效

蠅蝮尿瘡

蠅蝮尿瘡乃蜘蛛之尿瀦于人身頭上而生瘡也瘡如粟粒累累似蠅蝮螫痛或發熱惡寒此重者也有生瘡而人不知疼痛者此毒不重而輕者也磨犀角塗之最效或以葶藶縛搗去瘡汁再加黃金散敷上即安或取燕窠中土和醎醋塗之大良

直指方 仁齋治蜘蛛咬毒

縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服五錢至醉良久酒化爲水待瘡口出水盡仍塞瘡甚妙

人咬傷瘡

人咬成瘡皮破血流往往有潰爛者以人咬人何如是之重乎不知兩人厮打至以口咬人其忿怒之氣亦甚不平矣心既憤激口齒安得無毒哉此所以潰爛耳故身體一破咬傷血流之時卽爲施治則毒氣尚未深入自然易痊方用醋洗其傷破之口隨用敗龜板燒灰爲末香油調搽無龜甲卽用鱉甲亦妙萬勿聽其潰爛至于毒氣之深入

反難速愈也

砒霜 藥瘡

人服砒霜其火熱大毒內攻臟腑而四肢身體必外生紫
繫之斑與生瘡無異此火熱之毒攻突內外也其勢最急
古人急挖地一大坑以井水滿之令攪渾濁取水一碗與
飲之少刻又與之待渾身紫藥俱散一吐卽甦甚妙然單
用地漿鐸猶以未善也鐸受異人傳方加入苦參二兩煎
湯入于地漿中飲之更神別有數方無不神異服之皆可
救因備載之

苦參湯 治服砒霜累瘡

苦參 二兩 煎湯一碗同地漿飲之即大吐而愈

救死丹 治中砒毒壘成瘡死亡頃刻

生甘草 二兩 瓜蒂 七個 玄參 二兩 地榆 五錢 水煎服

一下喉即吐再煎渣服又吐即毒解而愈

瀉毒神丹 治中砒毒發紫壘用前藥不吐急用此

方瀉之

大黃 二兩 生甘草 二錢 白礬 一兩 當歸 三兩 水煎服

數碗飲之立時大瀉即生否則死矣

水漬手足了 爛瘡

手足乃四末也屬脾而最惡濕以脾爲濕土以濕投濕安得不助濕乎濕以加濕此濕瘡之所以生也况勞苦之人以其手足日浸漬于水漿之中烏能保皮膚之堅硬乎手足十指未免開裂而腐爛矣幸其氣血尚健不必內治但用外治而可愈外治用密陀僧煨赤置地上去火性碾細末先以礬水洗足拭乾然後以前藥敷之次日卽能行動矣倘氣血衰憊用補中益氣湯多治當歸加之尤效也

陀僧散 世傳治脚了濕爛

密陀 一兩

輕粉 一錢

熟石膏 二錢

錢

枯礬 二錢

錢

爲末濕

則乾敷乾則桐油調搽一方用栝子油一兩明雄

黃末五錢調搽亦效

試驗方 談野翁治脚縫出水

好黃丹 三錢

花蕊石 一錢

研絕細末搽之即止水

手足麻裂瘡

麻裂瘡生于手足與皴裂瘡相同然皴裂瘡生于四季而
麻裂瘡生于冬時也雖俱是貧寒之人不顧風雨以致手
足之開裂然亦天氣嚴寒過于血燥血不能潤膚遂至于

開裂而成瘡也故治法畧宜少異外以蘿蔔汁煎洗之次以臘月羊脂燃油滴入裂口卽愈如無羊脂以白芨研細末熱水調稠滴入裂口亦效倘血不足者用四物湯加減飲之尤妙

加味四物湯 內治手足癩裂瘡

熟地 五錢 川芎 二錢 當歸 五錢 白芍 三錢

荆芥 炒二錢 白芨末 二錢 水煎調服四劑

眼丹胞

眼胞爲肉輪屬脾胃乃土之象也人肉輪上生胞紅腫而

作膿名曰眼丹又名眼狐狸此胃火沸騰而上熾于目也
宜用三黃湯加減治之外用水澄膏塗之可愈

加減三黃湯

祖傳內治眼丹胞

石膏 三錢

黃芩 一錢

黃連 一錢

黃柏 一錢

炒梔子

五錢

柴胡 一錢

夏枯草 五錢

天花粉 二錢

錢

赤芍 三錢

水煎服四劑漸消

偷鍼眼

眼角上生小瘡癩

腫起乃心膽小腸之火也火重則生火

衰則輕毋論大人

小兒往往皆生此瘡凡生此瘡者必瀆

胸背之上覓別有小瘡否如或有之瘡窠上壘藥者宜用
針刺出其血眼疔瘡自愈矣倘若未愈宜診其脈看何經
火盛用藥微瀉之必愈

洞天奧旨卷之十四

山陰陳士鏗敬之甫號遠公著 曾孫陳鳳

會稽蘭式玉尚白甫號存齋評 玄孫增方泐泥氏核

瘡瘍腫潰諸方

救命丹 仙傳治癰疽各瘡陰症陽症無不神效

川山甲

三大片同蛤粉炒熟不用粉

甘草節

二錢乳香

一錢

天花粉

二錢赤芍

三錢皂角刺

五分去針貝母

二錢

一錢

沒藥

五分當歸

一兩陳皮

一錢

金銀花

一兩

防風 七分 白芷 一錢 白礬 一錢 生地 三錢 酒水各

數碗煎八分滄在上食後服滄在下食前服能飲

酒者外再多飲數盃忌酸酒鐵器服畢宜側臥少

爇有汗覺痛減大半有起死回生之功效難盡述

一癩疽發背在頭及腦後背脊加羌活一錢角刺

倍之此太陽經藥也

一在脇脅少陽經部位者加柴胡一錢瓜蒌仁二

錢

一在腹臍太陰者加陳皮五分赤芍三錢白芷一

錢

一 生在手臂膊加桂枝三分

一 生在腿膝加牛膝二錢防已五分黃柏一錢歸

尾三錢如腫硬加連翹二錢木鱉仁五分倘是疔

瘡方中加紫河車三錢蒼耳子二錢如人虛弱不

潰不起加人參三錢甘草一錢如人壯實加大黃

二錢麻黃一錢連根節用

金銀補益湯 家傳治瘡瘍元氣虛倦口乾發熱

金銀花 二兩 生黃芪 三錢 甘草 一錢 人參 三錢

同天錄 卷之十 四 金銀補益湯 人參散

白朮 二錢 陳皮 一錢 升麻 五分 柴胡 一錢

當歸 三錢 右水煎服

人參敗毒散 世傳治諸瘡瘍、焮痛、發熱、拘急、頭痛

脈數而有力者

人參 羌活 前胡 獨活 川芎 甘草

柴胡 桔梗 枳殼 茯苓 各等分

右水煎服如嘔吐加生薑陳皮半夏如脈細而無力加大力子半分

極驗落風湯 世傳治諸癰疽惡毒大患保全有大

功活人最多不可輕忽

穿山甲 四片

如瘡在背即用背上甲在手用前足

上山甲五分如在足用後腿上甲五分炙酥為末

真牛皮膠

四兩炒成珠

水酒各一碗調勻前二味煎數

沸服之以醉為度

加味十宣散 家傳治瘡瘍因外感風寒內因氣血

虛損經云百病乘虛而入是宜服此

人參 一錢

當歸 二錢

黃芪 三錢

甘草 一錢

白芷 一錢

川芎 一錢

桔梗 一錢

厚朴 薑製五分

加味十宣散 花醫錄

防風 三分 肉桂 三分 忍冬藤 五分 錢 水煎服如脈緩濟

而微加黃芪人參白朮如脈弦身倦加當歸白芍

麥冬如脈緊細加桂枝生地防風如脈洪大而虛

加黃芪黃連

花籐薜荔湯 岐天師傳治發背諸瘡癰初起

薜荔 二兩 金銀花 三兩 生黃芪 一兩 生甘草 二錢 水數碗

煎一碗渣再煎一劑即消

消散湯 長桑公傳治瘡瘍初起立時消散

金銀花 三兩 生甘草 三錢 蒲公英 三錢 天花粉 三錢

當歸 一兩 酒水各一碗煎服此方散邪解毒全不損傷正氣而奏效獨捷若遇陰症瘡瘍加入參五錢附子一錢尤妙若湯症瘡瘍萬不可加

柞木飲子 精要治癰疽未成自消已潰自乾輕小

証候可以倚伏

乾柞葉四兩 乾荷葉蒂 乾萱花根 甘草節

地榆各一兩 共爲末每服五錢水二碗煎一碗作二

次早晚分服

廻瘡金銀花散 準繩治瘡瘍痛甚色變紫黑

金銀花

二兩

黃芪

四兩

甘草

二兩 右用酒一升同入

茶瓶內閉口重湯煮三時辰取出去滓頓服之

神效托裏散

家傳治癰疽腫毒發背腸癰乳癰時

毒增寒壯熱不論老幼虛實俱效

黃芪

五錢

金銀花

一兩

當歸

五錢 生粉草

一鍾煎服渣搗敷患處或俱為末酒調服之更效

神散湯

世傳治癰疽初起

金銀花

八兩

水十碗煎二碗再入當歸二兩同煎一

氣服之不拘陰陽癰疽初起者散毒尤速如已四

五日者則減之半效然斷無性命之憂

金銀花酒 世傳治一切惡瘡癰疽不問發在何處
或肺癰腸癰初起便服之奇效

金銀花 五兩 甘草 一兩 水二碗煎一碗再入酒一碗

畧煎分三服一日一夜服盡重者日二劑服至大

小腸通利則藥力到外以鮮者搗爛酒調敷患處

彌佳

黃金飲 家傳治蒼生腿外側或因寒濕得附骨癰

于足少陽經分微受足陽明經堅硬漫腫行步作痛

或不能行並皆治之

柴胡

一錢五分

金銀花

一兩

大力子

一錢

肉桂

一錢

黃芪

五錢

歸尾

三錢

黃柏

七分

炙甘

五分

水酒各

半煎食前服

金銀五香湯

家傳治諸瘡一二日發寒熱厥逆咽

喉閉

金銀花

一兩

乳香

二錢

木通

二錢

大黃

二錢

連翹

一錢

沉香

一錢

木香

一錢

丁香

一錢

茴香

一錢

獨活

一錢

射干

一錢

升麻

一錢

甘草一錢 桑寄生一錢 右咀水二鐘薑三片煎服不

拘時

英花湯 世傳治癰疽未潰

金銀花一斤 蒲公英八兩 綿黃芪六兩 生甘草一兩

川貝母三錢 水煎作三次服完全愈

金銀解毒湯 祖傳治積熱瘡瘍焮腫作痛煩躁飲

冷脈洪數大實口舌生瘡疫毒發狂

黃芩一錢 黃柏一錢 黃連一錢 炒梔子一錢

金銀花一兩 水煎熱服

金銀六君湯 祖傳治瘡瘍作嘔不思飲食面黃噤

脹四肢倦怠大便溏利

人參 一錢 白朮 土炒 一錢 茯苓 一錢 半夏 薑製 一錢

陳皮 一錢 炙甘草 五分 金銀花 二兩 薑三片 聚二枚

水煎服如過食冷物致傷脾胃本方加藿香砂仁

消毒神聖丹 仙傳治背癰或胃腹頭面手足之疽

五日內服之即散

金銀花 四兩 蒲公英 二兩 生甘草 二兩 當歸 二兩

天花粉 五錢 水煎服一劑即消二劑全愈

散寒救陰至聖丹 仙傳治癰疽瘡色黑暗痛亦不
甚但覺沉沉身重瘡口不突起現無數小瘡口以欺
世人此方服之甚效

附子 三錢 人參 三兩 生黃芪 三兩 當歸 一兩

金銀花 三兩 白芥子 二錢 水煎服外貼至聖膏生肌末

藥五錢貼之一日兩換始可蓋陰症瘡瘍多生于

富貴膏粱之客功名失志之人心腎不交陰陽俱
耗又加憂愁拂鬱嗔怒呼號其氣不散乃結成大
毒母論在背在頭在腹在脇在手在足俱是危症

若用此方又用至聖膏藥無不全生蓋陽症可以涼解而陰症必須溫散也

立消湯 仙傳治癰疽發背或生頭項或生手足臂腿腰膂之間前陰糞門之際母論陰毒陽毒未潰即消已潰即斂

蒲公英

一兩

金銀花

四兩

當歸

二兩

玄參

一兩

水煎飢

服此方既善攻散諸毒又不耗損真氣可多服久服俱無碍也即治肺癰大小腸癰無不神效

通氣散 啓玄治一切癰疽發背流注折傷能救敗

壞瘡症活死肌彌患于未萌之前拔根于既愈之後

此劑之功妙不可言

生首烏五錢 當歸 三錢 赤芍 二錢 白芷 二錢

茴香 一錢 烏藥炒一錢 枳殼炒一錢 木通 一錢

甘草 二錢 忍冬藤 一兩 水酒煎服

一騰疽對口去木通加羌活藥本如虛弱加人參

黃芪

內疎黃連湯 易水治嘔吐心逆發熱而煩脈沉而

實腫硬瘡瘍

黃連 一兩
赤芍 一兩
當歸 一兩
檳榔 一兩

木香 一兩
黃芩 一兩
梔子 一兩
薄荷 一兩

桔梗 一兩
甘草 一兩
連翹 二兩
右共為末每服一

兩大便秘流加大黃一錢

內外復煎散 易水治腫爛于外根盤不深形症在

表

地骨皮 二兩
黃芪 二兩
防風 二兩
赤芍 一兩

黃芩 一兩
白朮 一兩
茯苓 一兩
人參 一兩

甘草 一兩
防己 一兩
當歸 一兩
桂枝 五錢

先用蒼木一斤煎至三升去蒼木入前藥再煎作三四次終日服之此除濕熱之劑也如或未已仍服

當歸黃芪湯 易水治瘡瘍臟腑已行而痛不可忍者

當歸 一錢五分 黃芪 一錢五分 生地 一錢五分 地骨皮 一錢五分

赤芍 一錢五分 水煎服如發熱加黃芩如煩躁加梔子

如嘔乃濕氣侵胃倍加白朮此準繩首載三方也

八仙散毒湯 祖傳治一切惡瘡初覺時連進三服

如失

當歸 五錢 熟地 五錢 甘草 二錢 黃芪 一兩

白芍 二錢 天花粉 三錢 金銀花 一兩 生地 二錢 水二碗

煎八分半飢服

中和湯 準經治岩瘍屬半陽半陰似潰非潰似腫

非腫此因元氣虛弱失于補托所致

人參 一錢 陳皮 一錢 黃芪 一錢 白木 一錢

當歸 一錢 白芷 一錢 茯苓 一錢 川芎 一錢

皂角刺 一錢 乳香 一錢 沒藥 一錢 金銀花 一錢

甘草節一錢水酒各半煎服

托裏散 世傳治一切惡瘡發背疔瘡便毒始發脈

弦數洪實腫甚欲作膿者此實熱堅滿之症故可下

之

金銀花一兩當歸一兩大黃三錢朴硝三錢

天花粉三錢連翹三錢牡蠣三錢皂角刺三錢

赤芍一錢黃芩一錢水酒煎服

回毒金銀花湯 世傳治瘡瘍色變紫黑

金銀花二兩甘草一兩芪四兩酒一升重湯煮服

金銀花 甘草 一兩 芪 四兩 酒一升重湯煮服

獲膜礬蠟丸 仲仁傳獲膜防毒內攻未破即消已

破即合一日之中服至百粒始有效驗服過半斤必

萬全也

白礬 二兩 黃蠟 一兩 煖化少冷 以蜜丸如梧子大

硃砂為衣每服二三十九酒吞服

托裏黃芪湯 世傳治瘡瘍潰後膿多內虛

黃芪 人參 桂心 遠志

麥冬 五味 等分 每服五錢食遠服

托裏溫中湯 世傳治瘡瘍寒變內陷膿出清稀皮

膚涼心下痞滿腸鳴腹痛大便微溏食則嘔逆氣短
呃逆不得安臥時發昏憤

附子 製四錢 炮姜 三錢 羌活 三錢 木香 一分

茴香 一錢 丁香 一錢 沉香 一錢 益智仁 一錢

陳皮 一錢 炙甘草 一錢 生薑 五片 水煎服

托裏神奇散 家傳諸瘡發背疔瘡

黃芪 五錢 厚朴 一錢 防風 一錢 桔梗 二錢

連翹 二錢 木香 五分 沒藥 去油 乳香 去油

當歸 五錢 川芎 八分 白芷 一錢 金銀花 一兩

芍藥 一錢
官桂 二錢
人參 二錢
甘草 三錢

水酒煎服

黃芪六一湯 世傳治癰疽潰後作渴及人無故作

渴或肺脈洪數必發癰疽服此際之

綿黃芪

六兩蜜水炒一半
鹽水炒一半

甘草

一兩半
生半炙

每服一兩

水煎食遠服

參花湯 家傳治潰瘍氣血俱虛發熱惡寒失血等

症

金銀花

一二兩

人參

一二兩

薑棗煎服

獨參湯 世傳治瘡瘍潰後氣血虛極令人發熱惡寒失血之症

人參 一二兩 棗十枚薑十片水煎徐徐服之

加減八味丸 世傳治瘡瘍將痊未痊作渴甚則舌

上生黃乃腎水虧極不能上潤令心火炎炎不能既

濟故心煩躁渴小便頻數白濁陰痿飲食少肌膚損

腿腫脚弱此方滋陰降火則無口舌瘡患矣

山藥 四兩 桂心 二兩 山茱萸 酒浸四兩 白茯苓 三澤瀉兩三兩

五味子 兩 牡丹皮 三兩 熟地 八兩 右為末蜜丸如桐

子大每服六七十丸空心送下

加味聖愈湯 世傳治瘡瘍膿水出多或金刀瘡血

出多不安不得眠五心煩熱

熟地 五錢 生地 五錢 川芎 五錢 人參 五錢

金銀花 一兩 當歸 三錢 黃芪 三錢 水煎食遠服

十味托裏散 世傳治發背癰疽癩毒乳癰脚痛未

成卽散已成卽潰敗膿自出惡毒自消痛疼頓減非

常之驗

人參 二錢 當歸 五錢 官桂 一錢 川芎 八分

防風 一錢
白芷 一錢
桔梗 二錢
黃芪 五錢

甘草 一錢
厚朴 一錢
水煎服

內托散 準繩治各瘡腫毒

大黃 五錢
牡蠣 五錢
瓜蒌 二枚
甘草 三錢

右剉末每服三錢水煎溫服

止痛當歸湯 世傳治背疽腦疽穿潰疼痛

當歸 生地 芍藥 黃芪

人參 甘草 官桂 各等
水煎服

補中益氣湯 世傳治瘡瘍倦怠口乾發熱飲食無

味或不食勞倦脈洪大無力或頭身痛惡寒自汗氣

高而喘虛煩

炙黃芪

一錢五分

炙甘草

一錢

人參

一錢

炒白朮

一錢

升麻

三分

柴胡

三分

當歸

一錢

金銀花

一兩

薑棗水

煎空心午前服

十全大補湯

世傳

人參

二錢

桂枝

二錢

熟地

二錢

川芎

二錢

茯苓

二錢

白朮

二錢

白芍

二錢

黃芪

二錢

當歸

二錢

甘草

一錢

薑棗水煎服

如虛弱極加熟

附子三分如未成膿者加枳殼香附連翹木鱉仁
數分如氣虛倍參芪如血虛倍芎歸加薑炭

八珍湯 世傳治瘡瘍脾胃傷損惡寒發熱煩躁作

渴或潰後氣血虧損膿水清稀久不能愈

人參 二錢 白朮 炒三錢 茯苓 一錢 甘草 一錢

當歸 三錢 川芎 八分 芍藥 一錢 熟地 一兩 薑棗水

煎食遠熱服

人參養榮湯 世傳治潰瘍脾胃虧損氣血俱虛發

熱惡寒四肢倦怠肌瘦面黃汲汲短氣食少作渴及

瘡不收口

人參 一錢
白朮 一錢
黃芪 一錢
桂心 一錢

當歸 一錢
甘草 一錢
白芍 一錢
熟地 三錢

茯苓 二錢
五味子 七分
炒梓 五分
遠志 五分
葶藶水煎服

加味養榮湯 家傳

人參 三錢
白朮 三錢
白芍 二錢
黃芪 五錢

桂心 一錢
當歸 三錢
甘草 一錢
熟地 一兩

茯苓 二錢
五味子 七分
遠志 一錢
銀花 一兩
葶藶水

煎服

治魂丹 世傳治癰疽惡瘡疔毒等類大有神效

乳香 一錢
沒藥 一錢
銅綠 一錢
枯礬 一錢

黃丹 一錢
穿山甲 一錢
輕粉 五分
蟾酥 五分

麝香 少許
共為細末蝸牛研為丸如菘葢大每服

一九至重者服二九葱白搗裹熱酒送下取汗透

為妙

內消神丹 家傳治各癰惡瘡

殭蠶 二錢
乳香 三錢
沒藥 三錢
枯礬 三錢

炙山甲 三錢
銅綠 三錢
黃丹 三錢
全蝎 四錢

治魂丹內消神丹

輕粉 一錢 蟾酥 一錢 麝香 二分 各為末蝸牛研為

丸每用一丸葱白搗裂熱酒送下汗透為佳

梅花點舌丹 內府傳治一切諸般無名腫毒十三

種紅絲等疔喉閉並傳寒等症神驗

硃砂 二錢 雄黃 二錢 白礬 二錢 血竭 一錢

乳香 二錢 沒藥 二錢 蟾酥 一錢 牛黃 一錢

苦葶藶 二錢 冰片 一錢 沉香 一錢 麝香 六分

珍珠 六分 熊膽 六分 共為細末將人乳浸透蟾酥

研入諸藥調勻和丸如梧桐子大金箔為衣凡遇

瘡毒用藥一丸壓舌根底含化隨津嚥下藥盡用
酒葱白隨量飲之蓋被臥之出汗爲度刻有效驗
合藥宜秘之忌發物三七日更妙

飛龍奪命丹 啓玄專治癰疽疔毒無名惡瘡渾身
憎寒惡心已成未成或黑陷毒氣內壅乃穿筋透骨
之劑無經不通故能宣泄汗吐三法俱備及中一切
毒禽惡獸肉毒所致成瘡及脈沉緊細數蘊毒在裏
并濕毒用之神效

硼砂 一錢
硃砂 二錢
黃丹 一錢
斑蝥 三錢

蟾酥

三錢

血竭

一錢

乳香

去油
三錢

沒藥

三錢

麝香

五分

人言

一錢

巴菝

去油
一錢

半夏

五分

硝砂

一錢

共為細末用頭生小兒乳汁搗蝸牛為

丸如菘菹大每五七丸各隨症引送下亦分上下

前後服之

一疔瘡初發渾身憎寒惡心先噙化一九如覺身

麻木用三五丸水吞下

一發背癰疽初起作渴用水吞三五丸

一乳蛾喉閉用一九噙化下

一下疔瘡用一丸

奪命丹 準繩

蟾酥 五分 輕粉 五分 硃砂 三錢 枯礬 一錢

寒水石 一錢 銅綠 一錢 乳香 一錢 沒藥 一錢

蝟牛 二十個 各為末蝟牛搗為丸加酒少許如菜豈

大每服一丸嚼生葱三五莖爛吐于手心包藥在

內熱服汗出為效重者再服一丸

內造蟾酥丸 專治一切諸般惡毒發背癰疽魚口

對口喉閉喉癰喉癭癰疔三十六種住節紅絲等疔

并蛇傷虎咬瘋犬惡舌所傷諸般大毒一并治之若
 瘡不痛或麻木或嘔吐痛未止病重者多昏憤此藥
 服之不起發者即發不痛者即痛痛甚者即止昏憤
 者即醒嘔吐者即改未成即消已成即潰真有回生
 之功乃惡瘡之至寶也

蟾酥

三錢
酒化

輕粉

五分

枯礬

一錢

寒水石

一錢

銅綠

一錢

乳香

一錢

膽礬

一錢

麝香

一錢

雄黃

二錢

蝸牛

二十個

硃砂

三錢
為衣

各為細末合藥於

端午日午時在淨室中先將蝸牛研爛再同蟾酥

和研調勻方入各藥共搗極勻丸如菘荳大硃砂
 爲衣每服三丸引用葱白五寸患者自嚼爛吐于
 男左女右手心包藥在內用無灰熱酒一鍾送下
 蓋被出汗如人行五六里出汗爲度甚者再進一
 服脩合時忌婦人雞犬見之經驗如神百發百中
 冲和膏 啓玄治癰疽發背流注折傷損痛流注痰
 塊癰疽軟疔及冷熱不明等瘡葱酒隨症敷之

紫荆皮炒五兩 獨活炒三兩 石菖蒲二兩 赤芍藥炒二兩
 白芷一兩 共爲細末

凡諸瘡瘍莫不因氣血凝滯之所生也紫荊皮係
木之精能破氣逐血獨活是土之精能引氣活血
拔骨中冷毒去肌肉中濕痺更與石菖蒲破石腫
硬如神赤芍是火之精能止痛活血生血去風石
菖蒲乃水之精能消腫止痛散血白芷是金之精
能去風生肌止痛肌生則肉不死血活則經絡通
肉不死則瘡不臭爛血活則瘡不焮腫故云風消
血自散氣通硬可除蓋人之五體皮肉筋骨血也
得五行之精而病除矣

一瘡勢熱極不用酒調可用葱泡湯調乘熱敷上
最妙如熱減亦用酒蓋酒能生血行血也

一瘡有黑暈瘡口無血色者是人曾用涼藥太過
宜加肉桂當歸是喚起死血則黑暈自退也如血
回只以正方用之

一痛不止加乳香沒藥酒化溶于火銚內後將此
酒調藥熱敷痛處

一流注筋不能伸者用乳香沒藥照前酒調敷最
能止痛

一瘡口有贅肉突出者其症有三一日着水二日
着風三日着怒皆有贅肉突出宜用此膏少加南
星末以去其風用薑汁酒調敷週圍如不消者必
是俗人誤以手着力擠出膿核太重又或以涼藥
冷了瘡口以致如此若投以熱藥則愈

一瘡勢熱盛不可驟用涼藥恐涼逼住血凝作痛
痛令瘡敗故宜溫冷相半使血得中和則容易愈
宜此方相對停洪寶膏用葱湯調塗貼之自效

一發背癰疽流注皆賴此方終始收功最穩妙在

通變活法取效在于掌握更無變壞等症况背癰
乃生死相關輕重皆能保守能知此藥兼陰陽而
奪化之樞機真神矣哉

廻陽玉龍膏 啓玄治諸陰發背流注鼓椎風久損

痛冷痺風濕諸脚氣冷腫無紅赤色痛不可忍者及
足頑麻婦人冷血風等症蓋此藥性溫熱故治諸陰
最妙

草烏 三兩 炒
南星 炒一兩
軍薑 煨二兩
香白芷 一兩

赤芍 炒一兩
肉桂 五錢
共爲末熱酒調敷

夫人之血氣週流一身周而復始無有間斷苟臟腑虧虛則風寒暑濕外邪得而襲之矣七情交感痰涎壅滯經絡不通寒熱交作兼之血脈凝泣隧道閉阻而成瘡瘍者多也故瘡瘍之症有虛有實有寒有熱實熱易治虛寒難療必細識其經絡部位辨明其寒熱虛實則萬不失一也此方內有軍薑肉桂足以禦寒能生血熱血草烏南星能破惡除堅祛風化毒活死肌除骨痛消結塊赤芍白芷能散滯血止痛生肌加酒行藥性雖有十分冷症

未有不愈者如發寒灰之焰枯木之春也大抵冷
症則肌肉陰爛不知痛癢有知痛者多附於骨痛
久則侵入骨髓非尋常藥力所能及矣此方祛陰
毒迴陽氣拔骨中痛如神當減當加活法開後

一治陰發背滿瘡面黑爛四圍好肉用洪寶膏把
住中間以此膏敷之一夜陽氣自回黑處皆紅當
察其紅活已透卽止此藥却以冲和膏收功如欲
作膿又以南星草烏爲末加于冲和膏內用之如
陽已回黑已紅惟中間一點黑而不能紅者蓋血

已死也可用朴硝明礬末又方白丁香硫砂乳香
末墜調勻點于黑紅交處一圍上以冲和膏蓋之
次早去藥黑死肉如割去甘草水洗淨方可上生
肌合口藥收功如黑肉未淨瀆去爲妙

一冷流注多附骨硬不消骨寒而痛筋縮不能伸
屈庸俗誤用刀鍼又無膿血只有屋漏清汁或有
瘀黑血宜此方敷之如稍緩加軍蓋白芷肉桂草
烏等分熱酒調敷則骨寒除而痛自止氣溫而而
筋自伸肉亦軟而腫卽消亦不可無木臘以其性

能破堅腫亦不可多多解別藥性故也

一治乳吹乳癰等初發切不可用涼藥恐凝住其血不能化乳宜此方中加南星薑汁酒勻調熱敷卽消欲急消加草烏末能破惡除寒如已成癰則用沖和膏治之或加草烏南星二味最妙如破後當觀其源若原于冷用沖和收功原于熱用洪寶膏退熱生肌瀆加乳香沒藥止痛內服神效瓜萸散治之

一宿痰失道癰腫無膿者用此藥點頭病必旁出

再作爲佳不然則元陽耗爲敗症如遇敗症當用
玉龍膏敷之拔毒成膿內服通神散加桔梗半夏
當歸肉桂等藥如病紅活熱驟則用沖和膏爲佳
切不可用涼藥此藥能拔毒成膿有膿卽止亦不
可過

一治肚癰一症十有九死蓋人之脾胃屬坤土爲
陰血氣潮聚趨熱避寒故多爲內癰不能外現間
有微影欲出或又被冷水所觸及服涼藥雖有仙
丹莫能施治可不慎乎凡有此症初覺腰痛且手

按之痛苦走閃移動則爲氣塊若推根不動外面
微有紅腫則爲內癱急以此方拔出毒氣作成外
癱則用冲和膏收功內服通神散加忍冬藤治法
如前若癱自能外現不可用此方只用冲和膏爲
妙當頂用玉龍膏貼之有頭自現自破若流膿不
快依法用洪寶膏三分薑汁七分茶調敷之膿出
皆盡內服十宣平補生肌外則用冲和膏收功此
症陰多陽少最能損人如將安之際大服補氣血
藥則易愈

洪寶膏 啓玄治諸熱癰疽等毒十分勢熱宜用此藥相兼用之蓋此藥性涼能化血又能破腫止痛若過陰症陰瘡能助痛凝血死肌爛肉不可用也沖和膏性溫玉龍膏性熱洪寶膏性寒三膏當參詳臨症施治在于活法加減也

天花粉 三兩 赤芍藥 二兩 薑黃 一兩 白芷 一兩 共爲細

末茶酒蜜湯乘熱塗之

搗毒散 準繩治瘡瘍腫毒疼痛

大黃 三兩 白芨 二兩 朴硝 四兩 共爲末井水調擦

如乾再搽若瘡口燥腫宜用之若腫而不痛乃陰
症也斷不宜用

水澄膏 郭氏

白芨 四錢 白朮 四錢 鬱金 一對 大黃 七錢

黃柏 七錢 黃藥子 七錢 榆皮 七錢 乳香 五錢

沒藥 五錢 雄黃 五錢 共為細末用新汲水一碗將

藥澄下水內藥定去水敷于腫處上用白紙封之

用雞翎涼水潤濕

鐵井欄 準繩

芙蓉葉重陽前收研末 蒼耳子端午前收燒灰
存性同研細末蜜水調敷

清涼膏 家傳治初患癰腫瘡痛熱熾大痛

大黃 芙蓉葉 共為細末米醋調敷之

千金方 治石癰堅硬不作膿者

葇荑子 為末醋和敷瘡頭根即拔出

烏龍掃毒膏 啓玄治一切癰疽發背腫毒已潰未

潰並皆治之

文蛤 八兩 多年浮粉 一筋曬乾入米醋浸一夜再

炒

調乾

蜒蠅 三十條

同搗一處再曬再搗成末再炒至黑色

為細末入磁罐收貯凡遇瘡疽用醋調敷患處

頭出毒氣綿紙蓋之乾再用醋掃潤之如背癰疽

發憤時痛不可忍用熟豬腦子去皮淨一個搗爛

調此成膏毒上敷之留頭出毒氣紙蓋之如瘡紅

紫熱毒勢甚痛用蜂蜜調敷更效

香蟾膏 祖傳治發背疔毒

活蝦蟆 一個 麝香 五厘 共搗如膏敷在患處留頭

如無頭都敷上一二日搗去倘未全愈再搗敷

烏龍膏 世傳治陰發背黑凹不知痛者

老生薑 半斤切 為末畧攤土地上出火毒少頃即

用豬膽汁明礬末調入薑末如糊敷在患處周圍

用紙蓋之乾用熱水潤之知痛時黑水自出為妙

如不知疼出黑水難治

東籬散 孫氏集效治癰疽疔腫無名惡毒

野菊花 一把連根 搗爛酒煎熱服取渣以外傳之即

愈

收毒散 瘡立治發背一兩頭開發不住勢在危急

卽以此藥貼之甚效

搃霜梅

十個山皂角

一挺不
蛙的

二味同燒灰存性共爲

細末如發熱者米醋調塗四圍及開處厚些卽不
走開或薑汁同醋調尤妙如發熱者蜜同醋調或
茶滴調塗之立愈